



Tabela de esquemas de tratamento do Sivep-Malária de acordo com o Guia de Tratamento da Malária no Brasil de 2020

Espécie parasitária	Grupo	Código	Descrição do esquema
<i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i>	Adultos	1	Infecções pelo <i>P. vivax</i> , ou <i>P. ovale</i> com Cloroquina em 3 dias e Primaquina em 7 dias.
		14	Infecções pelo <i>P. vivax</i> , ou <i>P. ovale</i> com Cloroquina em 3 dias e Tafenoquina.
		15	Tratamento de Recaída pelo <i>P. vivax</i> com Artemeter + Lumefantrina por 3 dias e Primaquina em 14 dias dose dobrada
		17	Tratamento de Recaída pelo <i>P. vivax</i> com Artesunato + Mefloquina por 3 dias e Primaquina em 14 dias dose dobrada
	Gestantes	24	Prevenção das recaídas por <i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i> com Cloroquina semanal.
		25	Infecção por <i>P. vivax</i> em gestante com Cloroquina por 3 dias e Cloroquina profilática até o primeiro mês de aleitamento
		27	Infecções pelo <i>P. malariae</i> para todas as idades e por <i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i> em gestantes, com Cloroquina em 3 dias.
		28	Infecções por <i>P. falciparum</i> , <i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i> ou mistas em gestantes ou crianças menores de 6m com a combinação de Artemeter + Lumefantrina em 3 dias, inclusive recaídas em crianças menores de 6m.
		29	Infecções por <i>P. falciparum</i> , <i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i> ou mistas em gestantes ou crianças menores de 6m com a combinação de Artesunato + Mefloquina em 3 dias, inclusive recaídas em crianças menores de 6m.
	Deficiente G6PD	13	Infecções pelo <i>P. vivax</i> , ou <i>P. ovale</i> com Cloroquina em 3 dias e Primaquina semanal.
	Menor de 6 meses	28	Infecções por <i>P. falciparum</i> , <i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i> ou mistas em gestantes ou crianças menores de 6m com a combinação de Artemeter + Lumefantrina em 3 dias, inclusive recaídas em crianças menores de 6m.
		29	Infecções por <i>P. falciparum</i> , <i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i> ou mistas em gestantes ou crianças menores de 6m com a combinação de Artesunato + Mefloquina em 3 dias, inclusive recaídas em crianças menores de 6m.
	Crianças de 6 a 11 meses	30	Infecções pelo <i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i> em crianças de 6 a 11m ou infecções mistas por <i>P. falciparum</i> e <i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i> em maiores de 6m, com Artemeter + Lumefantrina 3 dias e Primaquina em 7 dias.
		31	Infecções pelo <i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i> em crianças de 6 a 11m ou infecções mistas por <i>P. falciparum</i> e <i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i> em maiores de 6m, com Artesunato + Mefloquina 3 dias e Primaquina em 7 dias.
<i>P. falciparum</i>	Adultos e crianças maiores de 6 meses	11	Infecções por <i>P. falciparum</i> com a combinação fixa de Artemeter + Lumefantrina em 3 dias e Primaquina em dose única.
		12	Infecções por <i>P. falciparum</i> com a combinação fixa de Artesunato + Mefloquina em 3 dias e Primaquina em dose única.
	Menor de 6 meses e Gestantes	28	Infecções por <i>P. falciparum</i> , <i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i> ou mistas em gestantes ou crianças menores de 6m com a combinação de Artemeter + Lumefantrina em 3 dias, inclusive recaídas em crianças menores de 6m.
		29	Infecções por <i>P. falciparum</i> , <i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i> ou mistas em gestantes ou crianças menores de 6m com a combinação de Artesunato + Mefloquina em 3 dias, inclusive recaídas em crianças menores de 6m.
	Adultos	30	Infecções pelo <i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i> em crianças de 6 a 11m ou infecções mistas por <i>P. falciparum</i> e <i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i> em maiores de 6m, com Artemeter + Lumefantrina 3 dias e Primaquina em 7 dias.
		31	Infecções pelo <i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i> em crianças de 6 a 11m ou infecções mistas por <i>P. falciparum</i> e <i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i> em maiores de 6m, com Artesunato + Mefloquina 3 dias e Primaquina em 7 dias.
		28	Infecções por <i>P. falciparum</i> , <i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i> ou mistas em gestantes ou crianças menores de 6m com a combinação de Artemeter + Lumefantrina em 3 dias, inclusive recaídas em crianças menores de 6m.



Malária mista	Menor de 6 meses e Gestantes	29	Infecções por <i>P. falciparum</i> , <i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i> ou mistas em gestantes ou crianças menores de 6m com a combinação de Artesunato + Mefloquina em 3 dias, inclusive recaídas em crianças menores de 6m.
	Deficiente G6PD	16	Infecções mistas por <i>P. falciparum</i> e <i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i> com Artemeter + Lumefantrina em 3 dias e Primaquina semanal
		18	Infecções mistas por <i>P. falciparum</i> e <i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i> com Artesunato + Mefloquina em 3 dias e Primaquina semanal
	Crianças de 6 a 11 meses	30	Infecções pelo <i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i> em crianças de 6 a 11m ou infecções mistas por <i>P. falciparum</i> e <i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i> em maiores de 6m, com Artemeter + Lumefantrina 3 dias e Primaquina em 7 dias.
		31	Infecções pelo <i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i> em crianças de 6 a 11m ou infecções mistas por <i>P. falciparum</i> e <i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i> em maiores de 6m, com Artesunato + Mefloquina 3 dias e Primaquina em 7 dias
Maláriae	Todas	27	Infecções pelo <i>P. malariae</i> para todas as idades e por <i>P. vivax</i> ou <i>P. ovale</i> em gestantes, com Cloroquina em 3 dias.
Malária grave	Todas	26	Malária grave e complicada por todas as espécies de <i>Plasmodium</i> , em todas as faixas etárias e grupos populacionais.
Outros esquemas diferentes dos apresentados no guia		99	Outro esquema utilizado. Descrever.