

CONTROLE DA BRUCELOSE



BRUCELOSE

O QUE É?

Doença provocada por bactérias do gênero *Brucella*. Tem importância na saúde pública por ser uma zoonose, ou seja, pode passar dos animais para o homem, além de causar sérios prejuízos econômicos ao produtor rural.

QUAIS ESPÉCIES SÃO AFETADAS?

Afeta bovinos, bubalinos, suínos, caprinos, ovinos, equídeos, cães e roedores. Comprovar a vacinação das bezerras no mínimo uma vez por semestre, no escritório local da ADAPEC do seu município.

A emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) de bovinos ou bubalinos, qualquer que seja a finalidade, fica condicionada à comprovação de vacinação obrigatória contra brucelose no estabelecimento de criação de origem dos animais.



TRANSMISSÃO

COMO A DOENÇA É TRANSMITIDA AOS ANIMAIS?

Por meio do contato direto com as secreções de animais doentes; instalações (cercas, currais, baldes etc.); ingestão de pastagem e água contaminadas; sêmen contaminado e/ou material contaminado (inseminação artificial ou cobertura).

COMO A DOENÇA É TRANSMITIDA AO HOMEM?

Ao tomar leite cru ou comer seus derivados como: queijo, manteiga, coalhada, fabricados com leite de animais infectados que não passaram pelo processo de pasteurização e inspeção sanitária; comer carnes mal cozidas ou mal assadas, contaminadas; contato direto com o feto abortado, placenta e outras secreções eliminadas do útero da fêmea doente; manusear carnes e miúdos de animais doentes; a vacina também pode transmitir (patogênica para humanos).




SINTOMAS

QUAIS SÃO OS SINTOMAS DA DOENÇA NOS BOVINOS?

Aborto no final da gestação; morte de bezerros recém-nascidos; nascimento de bezerros fracos, retenção de placenta, corrimento vaginal; repetição de cio, queda na produção de leite; mastite; aumento do intervalo entre os partos; diminuição do número de nascimentos; nos machos o sinal mais comum é a inflamação dos testículos e inchaço nas articulações.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS DA DOENÇA NO HOMEM?

Febre, transpiração em abundância durante a noite, calafrios; respiração acelerada; dores nas juntas; dores de cabeça; inchaço nas articulações; infertilidade; impotência sexual; inflamação nos testículos; fraqueza; cansaço e dores generalizadas.



COMO PREVENIR ESTA DOENÇA?

ANIMAIS

Vacinar e identificar as fêmeas (bubalinas ou bovinas) de 3 a 8 meses de idade. Aquelas fêmeas que por algum motivo não foram vacinadas com a idade de três a oito meses, deverão ser vacinadas com a vacina RB51.

A vacinação só pode ser realizada por médicos veterinários ou auxiliares cadastrados junto à Adapec.

Ter o controle dos animais que entram na propriedade realizando exames de rotina para Brucelose e eliminar os animais que estiverem com a doença.

Quando houver casos de aborto, deve-se enterrar o feto, utilizando-se luvas para evitar contaminação e fazer a desinfecção do local.

HOMENS

Usar luvas de borracha longas; botas longas; aventais impermeáveis; roupas especiais que evitem contato com sangue, tecidos e secreções dos animais; lavagem rigorosa das mãos e braços com água e sabão após o serviço; usar solução antisséptica nas mãos e braços.

Consumir apenas alimentos **INSPECIONADOS!**
Não consumir leite cru, consumir leite pasteurizado ou fervido; evitar consumir derivados de leite cru (manteigas, iogurtes, queijos); evitar consumir carne mal cozida ou mal passada; evitar consumir subprodutos de carne não cozida.

Para esclarecer qualquer
dúvida, procure o escritório
mais próximo de você.

DISQUE-DEFESA: 0800 63 1122
WWW.ADAPEC.TO.GOV.BR



TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA
**AGRICULTURA, PECUÁRIA
E AQUICULTURA**

