

PROGRAMA ESTADUAL DO CONTROLE DA RAIVA DOS HERBÍVOROS



PROFILAXIA/ CONTROLE

VACINAÇÃO DOS HERBÍVOROS

Animais primovacinados (vacinados pela primeira vez) ou animais que foram vacinados há mais de um ano:

- ▶ Primeira dose - reforço com 30 dias - depois anualmente.

ATENÇÃO!

Nunca coloque a mão na boca de animais doentes.
Eles podem estar infectados com a raiva!



TIPOS DE CAPTURAS

EM ABRIGOS:

- ▶ Naturais: cavernas, oco de árvores, furnas, grutas etc.
- ▶ Artificiais: bueiros, casas abandonadas, minas abandonadas, garimpos abandonados, cisternas etc.

EM CURRAIS:

- ▶ À noite, dependendo da fase da lua.

ATENDIMENTO A FOCOS:

- ▶ Notificação feita pelo produtor;
- ▶ Buscas por abrigos de morcegos hematófagos;
- ▶ Orientações ao produtor rural.



COMO PROCEDER

EDUCAÇÃO SANITÁRIA:

- ▶ Levar orientação ao produtor rural sobre a doença, transmissão, prevenção e controle, por meio de palestras e dias de campo.

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL:

- ▶ Consiste no treinamento do técnico da ADAPEC por meio de reuniões e cursos para que a equipe possa atender com qualidade o produtor rural.

ATENÇÃO!

Em caso de suspeita da raiva na sua propriedade, procure imediatamente a unidade da Adapec mais próxima.



RAIVA DOS HERBÍVOROS. O QUE É?

Doença aguda do sistema nervoso central, que pode acometer todos os mamíferos, inclusive o homem. É caracterizada por uma encefalomielite fatal.

SINTOMAS

- ▶ Anorexia (falta de apetite)
- ▶ Andar cambaleante
- ▶ Isolamento
- ▶ Sialorreia (baba)
- ▶ Decúbito lateral (deita de lado)
- ▶ Movimentos de pedalagem
- ▶ Opistótono (cabeça voltada para trás)
- ▶ Nistagmo (oscilações rítmicas involuntárias dos olhos)



Para esclarecer qualquer
dúvida, procure o
escritório da Adapec mais
próximo de você.

DISQUE-DEFESA: 0800 63 1122
WWW.ADAPEC.TO.GOV.BR



TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA
**AGRICULTURA, PECUÁRIA
E AQUICULTURA**

